


Salofalk® 1,5 g és 3 g retard granulátum

meszsalazin



Az innovatív technológia a klinikai hatékonyság kulcsa

Az egyetlen meszsalazin tartalmú granulátum kettős hatóanyag-felszabadulást biztosító technológiával

-  Megbízható és gyors hatóanyag felszabadulás a vastagbél teljes hosszában.¹
-  Napi egyszeri alkalmazás akut és remisszióban lévő enyhe és közép súlyos colitis ulcerosában.*
-  A jó beteg compliance biztosító: az étkezéstől független bevétel és a kellemes vanília íz.
-  90%-os tb. támogatás, legolcsóbb meszsalazin tartalmú granulátum.

Irodalom: 1. Kruis et al: Gut, 2009. 58; 233-240.

* Salofalk 3g granulátum: naponta 1 tasak

Salofalk 1,5 g és 3 g gyomorerőd-ellenítő retard granulátum Hatóanyag: 1,5 g ill. 3 g meszsalazin tasakonként. **Terápiás javallatok:** Colitis ulcerosa akut fellebénésének kezelése és a tünetmentes állapot fenntartása. **Adagolás:** **Felnőttek és idősek:** Colitis ulcerosa akut fellebénésének kezelésére: Naponta egyszer 1 tasak Salofalk 3 g granulátum, 1 vagy 2 tasak Salofalk 1,5 g granulátum, 3 tasak Salofalk 1000 mg vagy 3 tasak Salofalk 500 mg granulátum (napi 1,5-3,0 g meszsalazinnal megfelelő), lehetőség szerint reggel alkalmazva, az egyedi klinikai igényeknek megfelelően. **Colitis ulcerosa tünetmentes állapotjának fenntartására:** A standard dózis 0,5 g meszsalazin 3x naponta (reggel, délután és este), ami napi 1,5 meszsalazinnal felel meg. Azonkál a betegnek, akinek a visszaesés kockázata ismert magasabb, egységszerűen 1 órával vagy napi háromszori adagolás nehézségekre utalozik, az adagolási rend naponta egyszer, lehetőleg reggel alkalmazható 3,0 g meszsalazinnal módosított. **Gyermekek populációja:** Gyermeknél (6-18 év közötti) való alkalmazással kapcsolatban csak kevés dokumentáció áll rendelkezésre. 6 éves és annál idősebb gyermekek. Aktív betegség: A dózist egyénileg kell megállapítani. Kezdetben 30-50mg/ttkg adható egyszer, lehetőleg reggel, vagy naponta több részre elosztva. A maximális dózis: 75 mg/ttkg/nap. A teljes napi dózis nem haladhatja meg a felnőtteknek ajánlott maximális dózist. Fenntartó kezelés: A dózist egyénileg kell megállapítani. Kezdetben 15-30 mg/ttkg adható naponta több részre elosztva. A teljes napi dózis nem haladhatja meg a felnőtteknek előírtat. Általánosságban javasolható, hogy 40 kg testtömeg alatt a fel-

nőtt dózis fele, míg 40 kg testtömeg felett a normál felnőtt dózis adandó. **Ellenjavallatok:** Túlerzékenység a szalicilátokkal vagy a készítmény bármely más összetevőjével szemben, súlyos máj- és vesekárosodás. **Övgyógyszerekkel való kölcsönhatások és egyéb interakciók:** Laktulóz vagy a széklet pH-ját csökkentő hasonló készítmények: a meszsalazin felszabadulásának mértéke a granulátumból csökkenhet a laktulóz bakterális metabolizmusra által kiváltott pH csökkenés következtében. Azatioprinrel, 6-merkaptopurinnal vagy tioguaninnal kezelt betegeknél ezen hatóanyagok mieloszuppresszív hatásának lehetséges növekedését figyelembe kell venni. Csekély bizonyíték van arra vonatkozóan, hogy a meszsalazin csökkentheti a warfarin anticoaguláns hatását. **Teljesítmény, terhesesség és szoptatás:** **Terhesesség:** A Salofalk granulátum terhes nőknél történő alkalmazása tekintetében nem áll rendelkezésre elegendő információ. A Salofalk granulátum csak akkor alkalmazható a terheség ideje alatt, ha a várható előny ellensúlyozza a lehetséges kockázatokat. **Szoptatás:** A Salofalk granulátum szoptatás alatt csak a terápiás előny/kockázat gondos mérlegelésével adható. Ha a csecsemőnél hasmenés lép fel, a szoptatást fel kell függeszteni. **Nemkívánatos hatások, mellékhatások:** Ritka: fejfájás, szédülés, myocarditis, pericarditis, hasi fájdalom, hasmenés, hányás. Nagyon ritka: vérszámzám-eltérések, perifériás neuropátia, a tüdő allergiás és fibrotikus reakció, akut pancreatitis, károsodott vesefunkció, alopecia, myalgia, arthralgia, túlerzékenységi reakciók, májfunkciós paraméterek változása, oligospermia. **Összegzés:** tasakonként 2,79 ill. 5,58 g granulátumot tartalmaz.

Készlet: 45 db tasak ill. 30 db tasak. **Hatáserősség:** * (egy kereszt). Rövidített alkalmazási előírt. Bővebb információért **kérjük olvassa el az alkalmazási előírt teljes szövegét** is! OGYI-T-1612/18 ill. OGYI-T-1612/15. Alkalmazási előírt: OGYI/39446/2013 ill. OGYI/39449/2013. **Salofalk 3 g retard granulátum 30x** Fogyszorú ár: 17520 Ft. Tb. támogatás: 15768 Ft (90%). Térítési díj: 1752 Ft. **Salofalk 1,5 g retard granulátum 45x** Fogyszorú ár: 13141 Ft. Tb. támogatás: 11827 Ft (90%). Térítési díj: 1314 Ft. Az információ lezárásának időpontja: 2015. szeptember 15.


Dr. Falk Pharma Képviselet

2040 Budaörs, Károly király út 39.
Tel.: +36 23 444 773, Fax: +36 23 444 774
e-mail: central@medicons.hu
www.medicons.hu